

# Elevage sous nourrice : Un bien-être autant pour l'éleveur que les animaux !

## Bien être de l'éleveur

### Téter aux pis : un gain de temps !

Il n'y a pas non plus nécessaire de faire apprendre à boire au veau, de faire attention à la température, à la propreté des seaux et au stockage du lait.

### Simplification de la main d'œuvre : l'observation le mot d'ordre !

Cette pratique permet une **simplification du temps de travail** et non une réduction du temps de travail.

Elle nécessite **moins de travail contraignant** comme porter des bidons de lait pour nourrir les veaux, de pailler et de curer les niches à veaux...

Ce gain de temps est **remplacé par un temps d'observation et de contact avec les animaux** pour ne pas perdre la docilité des animaux. Il permet de créer le lien veau-éleveur, établi normalement lors de la distribution de lait.

## Comment ne pas perdre le lien homme/animal ?

- ✓ **Passer beaucoup de temps parmi le lot** des veaux sous nourrice : Il faut aller les voir, essayer de les toucher.
- ✓ **Complémenter au pâturage** : Créer un lien nourricier.
- ✓ **« Remplacer » le lien avec la vache nourrice** avec le lien avec l'éleveur durant la phase sevrage.

## Bien être des animaux

### Sevrage tardif qui s'approche d'un sevrage naturel !

Le sevrage est effectué majoritairement **entre 7 et 9 mois**, il se rapproche d'un sevrage naturel qui a lieu **entre 8 et 11 mois** et permet de diminuer ainsi la réponse au stress .

### Un veau sous nourrice qui boit plus de lait !

Au cours des 14 premiers jours, la consommation des veaux sous nourrice a été **estimée jusqu'à 10 kg de lait par jour** et, par la suite, **jusqu'à 15 kg** par jour. En comparaison, un veau élevé classiquement reçoit **8 kg de lait par jour**.

### Disparition des comportements anormaux !

En l'allaitement artificiel, le veau est frustré de boire rapidement, et une à deux fois par jour. Ce manque de stimuli engendre des problèmes de comportement: la « tétée à vide » (entre congénères, objets), le léchage de barre ou encore des jeux de langues. Ces phénomènes n'ont pas lieux avec l'allaitement sous nourrice.

### Un contact constant avec des congénères pour les veaux

- ✓ **Favoriser l'apprentissage** au pâturage, à manger du fourrage plus précocement, aux clôtures, à marcher jusqu'aux champs.
- ✓ **Contribuer à des animaux très socialement actifs** : Comportement plus social. Les veaux sous nourrice explorent davantage leur environnement que les veaux allaitements artificiels.
- ✓ **Augmenter les interactions** avec des vaches adultes.